

PERFIL DOS ESTUDANTES COM CONJUNTIVITE HEMORRÁGICA AGUDA NA CIDADE DE NAMPULA, FEVEREIRO-MARÇO DE 2024

JAMILO CHABANE ^{1*}; FIEL CORREIA¹; MADALENA ZACARIAS¹; AMERICO BARATA¹

Filiação: ¹Instituto Nacional de Saúde-Delegação de Nampula

INTRODUÇÃO: A Conjuntivite Hemorrágica Aguda é caracterizada por quadro agudo de hiperemia ocular, dor, edema palpebral, sensação de corpo estranho, lacrimejamento excessivo, secreção ocular e fotofobia. Apresenta reação folicular, hemorragia subconjuntival e congestão ocular. A primeira epidemia de conjuntivite hemorrágica epidémica aguda foi descrita em 1969 em Gana, na África e o agente etiológico identificado foram os enterovírus 70¹. Desde então, epidemias explosivas têm ocorrido em vários locais do mundo, Moçambique, concretamente a Província de Nampula, sendo uma das áreas mais afetadas, tendo notificado mais de 7 mil casos e a cidade de Nampula com registo de 4 mil casos de Fevereiro a Março de 2024².

OBJECTIVO: Descrever o perfil dos estudantes com conjuntivite hemorrágica aguda na cidade de Nampula, Fevereiro a Março de 2024.




Imagem: Pacientes suspeitos de conjuntivite hemorrágica, HCN, Fev. 2024.

MÉTODO: Foi feito um estudo descritivo transversal com abordagem quantitativa de dados primários, envolvendo 301 estudantes suspeitos de conjuntivite hemorrágica aguda na Cidade de Nampula, de Fevereiro a Março de 2024, os dados foram extraídos de uma plataforma ODK (*Kit de banco de dados orientado a objeto*), na posse da Delegação Provincial do Instituto Nacional de Saúde de Nampula e analisados as variáveis sociodemográfico no pacote Microsoft Excel.

RESULTADOS: Dos 301 estudantes notificados com casos suspeitos de Conjuntivite Hemorragia Aguda, 54% (162/301) eram do sexo feminino, com maior frequência de 53% (85/162) na faixa etária dos 15 a 24 anos. Os níveis de escolaridade mais comuns foram o secundário 70% (210/301) e o primário 28% (85/301), pertencentes às escolas, secundária de Nampula e primária dos Limoeiros, respetivamente.




Figura 1: Proporção dos estudantes suspeitos conjuntivite hemorrágica Aguda (CHA) por sexo na Cidade de Nampula Fevereiro a Março de 2024




Figura 1: Distribuição dos estudantes suspeitos por conjuntivite hemorrágica aguda (CHA) por sexo e faixas etárias na Cidade de Nampula Fevereiro a Março de 2024




Figura 2: Nível de escolaridade e distribuição por Escolas dos estudantes suspeitos por conjuntivite hemorrágica Aguda (CHA) na Cidade de Nampula Fevereiro a Março de 2024

CONCLUSÃO: A cidade de Nampula regista maior prevalência dos casos notificados de estudantes suspeitos de Conjuntivite Hemorrágica Aguda, entre as mulheres na faixa etária de 15 a 24 anos (os adolescentes e jovens), maior parte dos estudantes sem sintomatologias sugestivas de Conjuntivite Hemorrágica. Recomenda-se educação para saúde nas escolas, de modo a parar com a cadeia de transmissão da doença.

PALAVRAS CHAVE: Estudantes; Nampula; Conjuntivite Hemorrágica Aguda.

REFERÊNCIAS

- (1) Waldman EA, Takimoto S, Ishida MA, Kitamura C, Mendonça LIZ. Enterovírus - 70 na região metropolitana de São Paulo, Brasil de 1984 a 1887: aspectos da infecção em períodos epidêmico e endêmico. Rev Inst Med Trop São Paulo 1990, 32:221-28.
- (2) mussa_chaleque. País monitora surto de conjuntivite hemorrágica. Misau. <https://misau.gov.mz/?p=9490> (accessed 2024-10-17).